Supporting Information

Synthesis of 4-Silapiperidine Building Blocks with N–H Groups Using the Staudinger Reaction

Markus Fischer, Reinhold Tacke*

Institut für Anorganische Chemie, Universität Würzburg, Am Hubland, D-97074 Würzburg, Germany

*E-mail: r.tacke@uni-wuerzburg. de; Fax +49-931-31-84609; Phone: +49-931-31-85250.



Figure S1. ¹H NMR spectrum of **13**·HCl.



Figure S2. ¹³C NMR spectrum of 13·HCl.



Figure S3. ²⁹Si NMR spectrum of 13·HCl.



Figure S4. ¹H NMR spectrum of **14**·HCl.



Figure S5. ¹³C NMR spectrum of 14·HCl.



Figure S6. ²⁹Si NMR spectrum of 14·HCl.



Figure S7. ¹H NMR spectrum of **17**.





Figure S9. ²⁹Si NMR spectrum of 17.



Figure S10. ¹H NMR spectrum of **18**.



Figure S11. ¹³C NMR spectrum of 18.



Figure S12. ²⁹Si NMR spectrum of 18.



Figure S13. ¹H NMR spectrum of 19.



Figure S14. ¹³C NMR spectrum of 19.



Figure S15. ²⁹Si NMR spectrum of 19.



Figure S16. ¹H NMR spectrum of 20.



Figure S17. ¹³C NMR spectrum of 20.



Figure S18. ²⁹Si NMR spectrum of 20.



Figure S19. ¹H NMR spectrum of 22.





Figure S21. ²⁹Si NMR spectrum of 22.



Figure S22. ¹H NMR spectrum of 23.





Figure S24. ²⁹Si NMR spectrum of 23.



Figure S25. ¹H NMR spectrum of 24.





Figure S27. ²⁹Si NMR spectrum of 24.



Figure S28. ¹H NMR spectrum of 25.



Figure S29. ¹³C NMR spectrum of 25.



Figure S30. ²⁹Si NMR spectrum of 25.



Figure S31. ¹³C NMR spectrum of 26.



Figure S32. ¹³C NMR spectrum of 26.



Figure S33. ²⁹Si NMR spectrum of 26.



Figure S34. ¹H NMR spectrum of 27.



Figure S35. ¹³C NMR spectrum of 27.



Figure S36. ²⁹Si NMR spectrum of 27.